MACI 2019 Vol. 7

VII

CONGRESO DE MATEMÁTICA APLICADA, COMPUTACIONAL E INDUSTRIAL

Luis R. Ceballos, Claudia M. Gariboldi y Bruno A. Rocca (Eds.)

Río Cuarto, Córdoba, Argentina
8 al 10 de Mayo de 2019

CONVERGENCIA DE CONTROLES ÓPTIMOS SIMULTÁNEOS DISTRIBUIDO-FRONTERA EN PROBLEMAS PARABÓLICOS

Carolina M. Bollo[†], Claudia M. Gariboldi[†] y Domingo A. Tarzia[‡]

[†] Dpto. Matemática, FCEFQyN, Univ. Nac. de Río Cuarto, Ruta 36 Km 601, 5800 Río Cuarto, Argentina.
cbollo@exa.unrc.edu.ar, cgariboldi@exa.unrc.edu.ar

[‡] Dpto. Matemática - CONICET, FCE, Univ. Austral, Paraguay 1950, S2000FZF Rosario, Argentina.
DTarzia@austral.edu.ar

Resumen: Se considera un problema evolutivo de conducción del calor P con condiciones de frontera mixtas en un dominio n -dimensional Ω con frontera regular y una familia de problemas P_α , donde $\alpha > 0$ es el coeficiente de transferencia del calor sobre una porción de la frontera Γ_1 . En relación a los estados del sistema, se formulan problemas de control óptimo simultáneos *distribuido-frontera* sobre la energía interna g y el flujo del calor q . Se obtiene existencia y unicidad de los controles óptimos, se dan las condiciones de optimalidad de primer orden en términos del estado adjunto y se prueba convergencia fuerte de los controles óptimos, los estados adjuntos y estados del sistema, cuando el coeficiente de transferencia del calor α tiende a infinito.

Palabras clave: Ecuaciones variacionales parabólicas, Control óptimo simultáneo, Existencia y unicidad, Condiciones de optimalidad. Comportamiento asintótico.

2000 AMS Subject Classification: 35K15, 35K20, 35R35, 49J20, 49K20.

1. INTRODUCCIÓN

Se considera un dominio acotado Ω en $\mathbb{R}^n$, cuya frontera regular Γ consiste de la unión de dos porciones disjuntas Γ_1 y Γ_2 con $med(\Gamma_1) > 0$ y $med(\Gamma_2) > 0$. Se denota con $med(\Gamma_i)$ (para $i = 1, 2$), la medida Hausdorff $(n - 1)$ -dimensional de Γ . Sea un intervalo de tiempo $[0, T]$, para algún $T > 0$. Se presentan los siguientes problemas evolutivos de conducción del calor P y P_α (para cada parámetro $\alpha > 0$) respectivamente, con condiciones de frontera mixtas (se indica con $u(t)$ a $u(\cdot, t)$)

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = g \quad \text{en } \Omega \quad u|_{\Gamma_1} = b \quad - \frac{\partial u}{\partial n}|_{\Gamma_2} = q \quad u(0) = v_b \quad (1)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = g \quad \text{en } \Omega \quad - \frac{\partial u}{\partial n}|_{\Gamma_1} = \alpha(u - b) \quad - \frac{\partial u}{\partial n}|_{\Gamma_2} = q \quad u(0) = v_b \quad (2)$$

donde u es la temperatura en $\Omega \times (0, T)$, g es la energía interna en Ω , b es la temperatura sobre Γ_1 para (1) y la temperatura del entorno externo de Γ_1 para (2), $v_b = b$ sobre Γ_1 , q es el flujo de calor sobre Γ_2 y $\alpha > 0$ es el coeficiente de transferencia de calor sobre Γ_1 , que satisfacen las hipótesis: $g \in \mathcal{H} = L^2(0, T; L^2(\Omega))$, $q \in \mathcal{Q} = L^2(0, T; L^2(\Gamma_2))$ y $b \in H^{\frac{1}{2}}(\Gamma_1)$. Sean u_{gq} y $u_{\alpha gq}$ la únicas soluciones de los problemas parabólicos (1) y (2), cuyas formulaciones variacionales están dadas por

$$\begin{cases} u_{gq} - v_b \in L^2(0, T; V_0), & u_{gq}(0) = v_b \quad \text{y} \quad \dot{u}_{gq} \in L^2(0, T; V_0') \\ \text{tal que} \quad \langle \dot{u}_{gq}(t), v \rangle + a(u_{gq}(t), v) = L_{gq}(t, v), & \forall v \in V_0, \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} u_{\alpha gq} \in L^2(0, T; V), & u_{\alpha gq}(0) = v_b \quad \text{y} \quad \dot{u}_{\alpha gq} \in L^2(0, T; V') \\ \text{tal que} \quad \langle \dot{u}_{\alpha gq}(t), v \rangle + a_\alpha(u_{\alpha gq}(t), v) = L_{\alpha gq}(t, v), & \forall v \in V, \end{cases} \quad (4)$$

donde $\langle \cdot, \cdot \rangle$ denota la paridad entre un espacio funcional (V ó V_0) y su espacio dual (V' ó V_0') y

$$\begin{aligned} V &= H^1(\Omega); & V_0 &= \{v \in V : v|_{\Gamma_1} = 0\}; & Q &= L^2(\Gamma_2); & H &= L^2(\Omega) \\ (g, h)_H &= \int_{\Omega} gh \, dx; & (q, \eta)_Q &= \int_{\Gamma_2} q\eta \, d\gamma; & a(u, v) &= \int_{\Omega} \nabla u \nabla v \, dx; & a_\alpha(u, v) &= a(u, v) + \alpha \int_{\Gamma_1} uv \, d\gamma \\ L_{gq}(t, v) &= (g(t), v)_H - (q(t), v)_Q; & L_{\alpha gq}(t, v) &= L_{gq}(t, v) + \alpha \int_{\Gamma_1} b(t)v \, d\gamma. \end{aligned}$$

Por simplicidad, en lo que sigue, para X un espacio de Banach con $1 \leq p \leq \infty$, se denotará $L^p(X)$ en lugar de $L^p(0, T; X)$. Así, se considera el espacio $\mathcal{H} := L^2(H)$, con norma $\|\cdot\|_{\mathcal{H}}$ y producto interno $(g, h)_{\mathcal{H}} = \int_0^T (g(t), h(t))_H dt$ y el espacio $\mathcal{Q} := L^2(Q)$, con norma $\|\cdot\|_{\mathcal{Q}}$ y producto interno $(q, \eta)_{\mathcal{Q}} = \int_0^T (q(t), \eta(t))_Q dt$. Se formulan los siguientes problemas de control óptimo simultáneos *distribuido-frontera* sobre la energía interna g y el flujo del calor q , [4, 5, 7]:

$$\text{hallar } (\bar{g}, \bar{q}) \in \mathcal{H} \times \mathcal{Q} \text{ tal que } J(\bar{g}, \bar{q}) = \min_{g \in \mathcal{H}, q \in \mathcal{Q}} J(g, q) \quad (5)$$

$$\text{hallar } (\bar{g}_\alpha, \bar{q}_\alpha) \in \mathcal{H} \times \mathcal{Q} \text{ tal que } J_\alpha(\bar{g}_\alpha, \bar{q}_\alpha) = \min_{g \in \mathcal{H}, q \in \mathcal{Q}} J_\alpha(g, q), \quad (6)$$

donde los funcionales costo J y J_α están dados por

$$J(g, q) := \frac{1}{2} \|u_{gq} - z_d\|_{\mathcal{H}}^2 + \frac{M_1}{2} \|g\|_{\mathcal{H}}^2 + \frac{M_2}{2} \|q\|_{\mathcal{Q}}^2$$

$$J_\alpha(g, q) := \frac{1}{2} \|u_{\alpha gq} - z_d\|_{\mathcal{H}}^2 + \frac{M_1}{2} \|g\|_{\mathcal{H}}^2 + \frac{M_2}{2} \|q\|_{\mathcal{Q}}^2,$$

con $z_d \in \mathcal{H}$ dado y M_1, M_2 constantes positivas.

En [3], se estudiaron problemas de control óptimo frontera sobre el flujo de calor q en problemas elípticos mixtos y se probaron resultados de existencia, unicidad y comportamiento asintótico de las soluciones óptimas, cuando el coeficiente de transferencia del calor tiende a infinito. Similares resultados fueron obtenidos por los mismos autores en [4] para problemas de control óptimo simultáneos distribuido-frontera sobre la energía interna g y el flujo del calor q en problemas elípticos mixtos. En [6], resultados de convergencia fueron probados para problemas de conducción del calor evolutivos en relación a problemas de control óptimo sobre la energía interna g . En [1] y [2], fueron estudiados problemas de control óptimo sobre la fuente de energía g y el flujo q respectivamente, para inecuaciones variacionales parabólicas de segunda clase. En el presente trabajo, en la Sección 2, se estudian problemas de control óptimo simultáneos distribuido-frontera para problemas evolutivos de conducción del calor y se obtienen resultados de existencia y unicidad de los controles óptimos y se dan las condiciones de optimalidad de primer orden en términos del estado adjunto del sistema. En la Sección 3 se obtienen resultados de convergencia cuando el coeficiente de transferencia del calor tiende a infinito.

2. PROBLEMAS DE CONTROL ÓPTIMO SIMULTÁNEOS DISTRIBUIDO-FRONTERA

2.1. PROBLEMA P Y SU CORRESPONDIENTE PROBLEMA DE CONTROL ÓPTIMO

Se prueba existencia y unicidad del control óptimo simultáneo $(\bar{g}, \bar{q})$ para el problema (5) y se da la condición de optimalidad en términos del estado adjunto del sistema $p_{\bar{g}\bar{q}}$.

Siguiendo [4, 5, 6], se define la aplicación $C : \mathcal{H} \times \mathcal{Q} \rightarrow L^2(V_0)$ por $C(g, q) = u_{gq} - u_{00}$ donde u_{00} es la solución del problema (3) para $g = 0$ y $q = 0$. Más aún, se consideran $\Pi : (\mathcal{H} \times \mathcal{Q}) \times (\mathcal{H} \times \mathcal{Q}) \rightarrow \mathbb{R}$ y $\mathcal{L} : \mathcal{H} \times \mathcal{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por

$$\Pi((g, q), (h, \eta)) = (C(g, q), C(h, \eta))_{\mathcal{H}} + M_1(g, h)_{\mathcal{H}} + M_2(q, \eta)_{\mathcal{Q}},$$

$$\mathcal{L}((g, q)) = (C(g, q), z_d - u_{00})_{\mathcal{H}} \quad \forall (g, q), (h, \eta) \in \mathcal{H} \times \mathcal{Q}$$

y se da el siguiente resultado cuya prueba es omitida.

Lema 1 Existe un único control óptimo $(\bar{g}, \bar{q}) \in \mathcal{H} \times \mathcal{Q}$ tal que

$$J(\bar{g}, \bar{q}) = \min_{g \in \mathcal{H}, q \in \mathcal{Q}} J(g, q).$$

Se define el estado adjunto p_{gq} correspondiente al problema (3) para cada $(g, q) \in \mathcal{H} \times \mathcal{Q}$, como la única solución de la ecuación variacional

$$\begin{cases} p_{gq} \in L^2(V_0), & p_{gq}(T) = 0 \quad \text{y} \quad \dot{p}_{gq} \in L^2(V'_0) \quad \text{tal que} \\ -\langle \dot{p}_{gq}(t), v \rangle + a(p_{gq}(t), v) = (u_{gq}(t) - z_d, v)_H, & \forall v \in V_0, \end{cases} \quad (7)$$

y se da el siguiente resultado.

Lema 2 Si J' denota la derivada Gâteaux del funcional J , entonces la condición de optimalidad para el problema (5) es, $\forall (h, \eta) \in \mathcal{H} \times \mathcal{Q}$

$$\langle J'(\bar{g}, \bar{q}), (h, \eta) \rangle = (M_1 \bar{g} + p_{\bar{g}\bar{q}}, h) + (M_2 \bar{q} - p_{\bar{g}\bar{q}}, \eta) = 0.$$

2.2. PROBLEMA P_α Y SU CORRESPONDIENTE PROBLEMA DE CONTROL ÓPTIMO

Se prueba, para cada $\alpha > 0$, la existencia y unicidad del control óptimo simultáneo $(\bar{g}_\alpha, \bar{q}_\alpha) \in \mathcal{H} \times \mathcal{Q}$ para el problema (6) y se da la condición de optimalidad en términos del estado adjunto $p_{\alpha \bar{g}_\alpha \bar{q}_\alpha}$.

Lema 3 Existe un único control óptimo $(\bar{g}_\alpha, \bar{q}_\alpha)$ tal que

$$J_\alpha(\bar{g}_\alpha, \bar{q}_\alpha) = \min_{(g,q) \in \mathcal{H} \times \mathcal{Q}} J_\alpha(g, q).$$

Se define el estado adjunto $p_{\alpha gq}$ correspondiente a (4) para cada $(g, q) \in \mathcal{H} \times \mathcal{Q}$, como la única solución de

$$\begin{cases} p_{\alpha gq} \in L^2(V), & p_{\alpha gq}(T) = 0 \quad \text{y} \quad \dot{p}_{\alpha gq} \in L^2(V') \quad \text{tal que} \\ -\langle \dot{p}_{\alpha gq}(t), v \rangle + a_\alpha(p_{\alpha gq}(t), v) = (u_{\alpha gq}(t) - z_d, v)_H, & \forall v \in V \end{cases} \quad (8)$$

y para cada $\alpha > 0$, se obtiene una propiedad análoga a la dada en el Lema 2.

3. CONVERGENCIA DE PROBLEMAS DE CONTROL ÓPTIMO SIMULTÁNEOS DISTRIBUIDO-FRONTERA CUANDO $\alpha \rightarrow \infty$

Para cada (g, q) fijo en $\mathcal{H} \times \mathcal{Q}$ se dan estimaciones en relación al estado del sistema $u_{\alpha gq}$ y al estado adjunto $p_{\alpha gq}$, cuya prueba es omitida.

Lema 4 i) Si u_{gq} y $u_{\alpha gq}$ son las únicas soluciones de los problemas variacionales (3) y (4) respectivamente, se tiene

$$\|\dot{u}_{\alpha gq}\|_{L^2(V'_0)} + \|u_{\alpha gq}\|_{L^\infty(H)} + \|u_{\alpha gq}\|_{L^2(V)} + \sqrt{(\alpha - 1)} \|u_{\alpha gq} - b\|_{L^2(L^2(\Gamma_1))} \leq C \quad (9)$$

para todo $\alpha > 1$, donde la constante C depende sólo de las normas $\|\dot{u}_{gq}\|_{L^2(V'_0)}$, $\|\dot{u}_{gq}\|_{L^2(V')}$, $\|\nabla u_{gq}\|_{L^2(H)}$, $\|u_{gq}\|_{L^2(V)}$, $\|u_{gq}\|_{L^\infty(H)}$, $\|g\|_{L^2(V')}$, $\|q\|_{L^2(H^{1/2}(\Gamma_2))}$ y de la constante de coercividad λ_1 de a_1 .

ii) Si p_{gq} y $p_{\alpha gq}$ son las únicas soluciones de los problemas variacionales (7) y (8) respectivamente, se tiene

$$\|\dot{p}_{\alpha gq}\|_{L^2(V'_0)} + \|p_{\alpha gq}\|_{L^\infty(H)} + \|p_{\alpha gq}\|_{L^2(V)} + \sqrt{(\alpha - 1)} \|p_{\alpha gq}\|_{L^2(L^2(\Gamma_1))} \leq D \quad (10)$$

para todo $\alpha > 1$, donde la constante D depende de λ_1 y de las normas $\|\dot{p}_{gq}\|_{L^2(V'_0)}$, $\|\dot{p}_{gq}\|_{L^2(V')}$, $\|\nabla p_{gq}\|_{L^2(H)}$, $\|p_{gq}\|_{L^2(V)}$, $\|p_{gq}\|_{L^\infty(H)}$, $\|g\|_{L^2(V')}$, $\|q\|_{L^2(H^{1/2}(\Gamma_2))}$, $\|z_d\|_{L^2(H)}$, $\|\dot{u}_{gq}\|_{L^2(V')}$, $\|\nabla u_{gq}\|_{L^2(H)}$, $\|u_{gq}\|_{L^2(V)}$, $\|u_{gq}\|_{L^\infty(H)}$.

Como consecuencia del anterior resultado se puede probar el teorema que se da a continuación.

Teorema 1 Para cada (g, q) fijo en $\mathcal{H} \times \mathcal{Q}$, cuando $\alpha \rightarrow \infty$,

i) $u_{\alpha gq} \rightarrow u_{gq}$ fuerte en $L^2(V) \cap L^\infty(H)$ y $\dot{u}_{\alpha gq} \rightarrow \dot{u}_{gq}$ fuerte en $L^2(V'_0)$.

ii) $p_{\alpha gq} \rightarrow p_{gq}$ fuerte en $L^2(V) \cap L^\infty(H)$ y $\dot{p}_{\alpha gq} \rightarrow \dot{p}_{gq}$ fuerte en $L^2(V'_0)$.

Ahora, en el siguiente teorema se prueba la convergencia fuerte de los controles óptimos de los problemas (5) y (6), los estados adjuntos y estados del sistema, cuando $\alpha \rightarrow \infty$.

- Teorema 2**
- i) Si $u_{\bar{g}\bar{q}}$ y $u_{\alpha\bar{g}_\alpha\bar{q}_\alpha}$ son los únicos estados correspondientes a los controles óptimos simultáneos de los problemas (5) y (6) respectivamente, entonces $(u_{\alpha\bar{g}_\alpha\bar{q}_\alpha}, \dot{u}_{\alpha\bar{g}_\alpha\bar{q}_\alpha}) \rightarrow (u_{\bar{g}\bar{q}}, \dot{u}_{\bar{g}\bar{q}})$ en $L^2(V) \times L^2(V'_0)$, cuando $\alpha \rightarrow \infty$.
- ii) Si $p_{\bar{g}\bar{q}}$ y $p_{\alpha\bar{g}_\alpha\bar{q}_\alpha}$ son los únicos estados adjuntos correspondientes a los controles óptimos simultáneos de los problemas (5) y (6) respectivamente, entonces $(p_{\alpha\bar{g}_\alpha\bar{q}_\alpha}, \dot{p}_{\alpha\bar{g}_\alpha\bar{q}_\alpha}) \rightarrow (p_{\bar{g}\bar{q}}, \dot{p}_{\bar{g}\bar{q}})$ en $L^2(V) \times L^2(V'_0)$, cuando $\alpha \rightarrow \infty$.
- iii) Si $(\bar{g}, \bar{q})$ y $(\bar{g}_\alpha, \bar{q}_\alpha)$ son las únicas soluciones de los problemas de control óptimo simultáneos distribuido-frontera (5) y (6) respectivamente, entonces $(\bar{g}_\alpha, \bar{q}_\alpha) \rightarrow (\bar{g}, \bar{q})$ en $\mathcal{H} \times \mathcal{Q}$, cuando $\alpha \rightarrow \infty$.

Prueba. Se dará sólo una idea de la prueba en los dos pasos siguientes.

Paso 1. De las estimaciones (9) y (10) y el hecho que $J_\alpha(\bar{g}_\alpha, \bar{q}_\alpha) \leq J_\alpha(0, 0)$, se deduce que existen $f \in \mathcal{H}$, $\delta \in \mathcal{Q}$, $\mu \in L^2(V)$, $\dot{\mu} \in L^2(V'_0)$, $\rho \in L^2(V)$ y $\dot{\rho} \in L^2(V'_0)$ tales que se tienen las convergencias débiles:

$$\begin{aligned} \bar{g}_\alpha \rightharpoonup f \in \mathcal{H}, \quad \bar{q}_\alpha \rightharpoonup \delta \in \mathcal{Q}, \quad u_{\alpha\bar{g}_\alpha\bar{q}_\alpha} \rightharpoonup \mu \in L^2(V), \quad \dot{u}_{\alpha\bar{g}_\alpha\bar{q}_\alpha} \rightharpoonup \dot{\mu} \in L^2(V'_0), \\ p_{\alpha\bar{g}_\alpha\bar{q}_\alpha} \rightharpoonup \rho \in L^2(V), \quad \dot{p}_{\alpha\bar{g}_\alpha\bar{q}_\alpha} \rightharpoonup \dot{\rho} \in L^2(V'_0). \end{aligned}$$

Luego, se prueba que $\mu = u_{f\delta}$ y $\rho = p_{f\delta}$. Así, de la condición de optimalidad para el problema (6), se deduce que $f = \bar{g}$ y $\delta = \bar{q}$ y por lo tanto, $u_{f\delta} = u_{\bar{g}\bar{q}}$, $p_{f\delta} = p_{\bar{g}\bar{q}}$, $\dot{u}_{f\delta} = \dot{u}_{\bar{g}\bar{q}}$ y $\dot{p}_{f\delta} = \dot{p}_{\bar{g}\bar{q}}$.

Paso 2. Usando que $(\bar{g}, \bar{q})$ es el par óptimo y teniendo en cuenta que $\bar{q}_\alpha \rightarrow \bar{q}$ en $\mathcal{Q}$, $\bar{g}_\alpha \rightarrow \bar{g}$ en $\mathcal{H}$ y $u_{\alpha\bar{g}_\alpha\bar{q}_\alpha} \rightarrow u_{\bar{g}\bar{q}}$ en $L^2(V)$, se tiene que $(\bar{g}_\alpha, \bar{q}_\alpha, u_{\alpha\bar{g}_\alpha\bar{q}_\alpha}) \rightarrow (\bar{g}, \bar{q}, u_{\bar{g}\bar{q}})$ en $\mathcal{H} \times \mathcal{Q} \times \mathcal{H}$, cuando $\alpha \rightarrow \infty$. Ahora, si se toma $v = u_{\alpha\bar{g}_\alpha\bar{q}_\alpha}(t) - u_{\bar{g}\bar{q}}(t) \in V$ en (4) para $u = u_{\alpha\bar{g}_\alpha\bar{q}_\alpha}$ y se denota por $z_\alpha = u_{\alpha\bar{g}_\alpha\bar{q}_\alpha} - u_{\bar{g}\bar{q}}$, se obtiene

$$\lambda_1 \|z_\alpha(t)\|_V^2 \leq (\bar{g}_\alpha(t) - \dot{u}_{\bar{g}\bar{q}}(t), z_\alpha(t))_H - (\bar{q}_\alpha(t), z_\alpha(t))_Q - a(u_{\bar{g}\bar{q}}(t), z_\alpha(t)).$$

Integrando entre 0 y T y teniendo en cuenta que $z_\alpha \rightarrow 0$ en $L^2(V)$, $\bar{q}_\alpha \rightarrow \bar{q}$ en $\mathcal{Q}$ y $\bar{g}_\alpha \rightarrow \bar{g}$ en $\mathcal{H}$ se tiene que $z_\alpha \rightarrow 0$ en $L^2(V)$. Además, de (3) y (4) se deduce que existe una constante $E > 0$ tal que

$$\|\dot{z}_\alpha\|_{L^2(V'_0)}^2 \leq E(\|z_\alpha\|_{L^2(V)}^2 + \|\bar{g}_\alpha - \bar{g}\|_{\mathcal{H}}^2 + \|\bar{q} - \bar{q}_\alpha\|_{\mathcal{Q}}^2).$$

Puesto que $\bar{q}_\alpha \rightarrow \bar{q}$ en $\mathcal{Q}$, $\bar{g}_\alpha \rightarrow \bar{g}$ en $\mathcal{H}$ y $u_{\alpha\bar{g}_\alpha\bar{q}_\alpha} \rightarrow u_{\bar{g}\bar{q}}$ en $L^2(V)$, se puede decir que $\dot{z}_\alpha \rightarrow 0$ en $L^2(V'_0)$, esto es $\dot{u}_{\alpha\bar{g}_\alpha\bar{q}_\alpha} \rightarrow \dot{u}_{\bar{g}\bar{q}}$ en $L^2(V'_0)$, cuando $\alpha \rightarrow \infty$.

De manera similar, se prueba que $(p_{\alpha\bar{g}_\alpha\bar{q}_\alpha}, \dot{p}_{\alpha\bar{g}_\alpha\bar{q}_\alpha}) \rightarrow (p_{\bar{g}\bar{q}}, \dot{p}_{\bar{g}\bar{q}})$ en $L^2(V) \times L^2(V'_0)$, cuando $\alpha \rightarrow \infty$. $\square$

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido parcialmente subsidiado por los Proyectos PIP No. 0275 de CONICET-Univ. Austral, ANPCyT PICTO Austral No. 0090, Rosario, Argentina y PPI No 18/C468 de SECyT-UNRC, Río Cuarto, Argentina.

REFERENCIAS

- [1] BOUKROUCHE M. - TARZIA D. A., *Existence, uniqueness, and convergence of optimal control problems associated with parabolic variational inequalities of the second kind*, Nonlinear Analysis: Real World Applications, 12, 2211-2224 (2011).
- [2] BOUKROUCHE M. - TARZIA D. A., *Convergence of optimal control problems governed by second kind parabolic variational inequalities*, J. Control Theory Appl. 11, 422-427 (2013).
- [3] GARIBOLDI C. M. - TARZIA D. A., *Convergence of boundary optimal control problems with restrictions in mixed elliptic Stefan-like problems*, Adv. in Diff. Eq. and Control Processes, 1(2), 113-132 (2008).
- [4] GARIBOLDI C. M. - TARZIA D. A., *Existence, uniqueness and convergence of simultaneous distributed-boundary optimal control problems*, Control and Cybernetics, 44, 5-17 (2015).
- [5] LIONS J.L., *Contrôle optimal de systèmes gouvernés par des équations aux dérivées partielles*, Dunod, Paris (1968).
- [6] MENALDI J. - TARZIA D. A., *A distributed parabolic control with mixed boundary conditions*, Asymptotic Analysis 52, 227-241 (2007).
- [7] TRÖLSTZSCH F., *Optimal control of partial differential equations. Theory, methods and applications*, American Math. Soc., Providence (2010).