DOBLE CONVERGENCIA EN PROBLEMAS DE CONTROL ÓPTIMO SIMULTÁNEOS PARA LA ECUACIÓN DE HELMHOLTZ

Claudia M. Gariboldi¹, Andrea del V. Maero¹ y Domingo A. Tarzia^{2,3}

¹*Depto. Matemática, FCEFQyN, Univ. Nac. de Río Cuarto, Ruta 36 Km 601, 5800 Río Cuarto, Argentina.*

cgariboldi@exa.unrc.edu.ar; amaero@exa.unrc.edu.ar

²*Depto. Matemática, FCE, Universidad Austral, Paraguay 1950, S2000FZF Rosario, Argentina.*

³*CONICET, Argentina. DTarzia@austral.edu.ar*

Resumen: En este trabajo se consideran problemas elípticos con condiciones de frontera mixtas para las ecuaciones de Poisson y Helmholtz. Se formulan problemas de control óptimo simultaneos distribuido-frontera, sobre la energía interna g y el flujo de calor q , dependiendo de dos parámetros positivos, λ en la ecuación de Helmholtz y α en la condición de Robin. Se obtienen resultados de existencia y unicidad del vector control óptimo, se dan las condiciones de optimalidad de primer orden y se obtiene un esquema conmutativo de convergencia entre los controles óptimos, los estados del sistema y estados adjuntos, cuando los parámetros $\lambda \rightarrow 0^+$ y $\alpha \rightarrow +\infty$. Más aún, se prueba la doble convergencia de las soluciones óptimas cuando $(\lambda, \alpha) \rightarrow (0^+, +\infty)$, simultáneamente.

Palabras clave: *Ecuaciones variacionales elípticas, Ecuación de Helmholtz, Control óptimo, Convergencia.*

2020 AMS Subject Classification: 35A15, 35J20, 49J20, 49K20.

1. INTRODUCCIÓN

Se considera un dominio acotado Ω en $\mathbb{R}^n$, cuya frontera regular Γ consiste en la unión de dos porciones disjuntas Γ_1 y Γ_2 con $|\Gamma_i| > 0$ (para $i = 1, 2$). Se denota con $|\Gamma_i|$, la medida de Hausdorff $(n - 1)$ -dimensional de la porción Γ_i en Γ . Se presentan los siguientes problemas elípticos mixtos [4]:

- **Problema P :**

$$-\Delta u = g \text{ en } \Omega \quad u|_{\Gamma_1} = b \quad -\frac{\partial u}{\partial n}|_{\Gamma_2} = q \tag{1}$$

- **Problema P_α ,** para cada $\alpha > 0$:

$$-\Delta u = g \text{ en } \Omega \quad -\frac{\partial u}{\partial n}|_{\Gamma_1} = \alpha(u - b) \quad -\frac{\partial u}{\partial n}|_{\Gamma_2} = q \tag{2}$$

- **Problema P^λ ,** para cada $\lambda > 0$:

$$-\Delta u + \lambda u = g \text{ en } \Omega \quad u|_{\Gamma_1} = b \quad -\frac{\partial u}{\partial n}|_{\Gamma_2} = q \tag{3}$$

- **Problema P_α^λ ,** para cada $\lambda > 0$ y $\alpha > 0$:

$$-\Delta u + \lambda u = g \text{ en } \Omega \quad -\frac{\partial u}{\partial n}|_{\Gamma_1} = \alpha(u - b) \quad -\frac{\partial u}{\partial n}|_{\Gamma_2} = q \tag{4}$$

donde u es la temperatura en Ω , g es la energía interna en Ω , b es la temperatura sobre Γ_1 para (1) y (3) y la temperatura en un entorno externo de Γ_1 para (2) y (4), q es el flujo de calor en Γ_2 y $\alpha > 0$ es el coeficiente de transferencia de calor en Γ_1 , que satisfacen: $g \in H = L^2(\Omega)$, $q \in Q = L^2(\Gamma_2)$ y $b \in H^{\frac{1}{2}}(\Gamma_1)$.

Se denotan con u , u_α , u^λ y u_α^λ a las únicas soluciones de los problemas elípticos (1), (2), (3) y (4) respectivamente, cuyas ecuaciones variacionales estan dadas por [5]:

$$a(u, v) = L(v), \quad \forall v \in V_0, \quad u \in K, \tag{5}$$

$$a_\alpha(u, v) = L_\alpha(v), \quad \forall v \in V, \quad u \in V, \tag{6}$$

$$a^\lambda(u, v) = L(v), \quad \forall v \in V_0, \quad u \in K, \tag{7}$$

$$a_\alpha^\lambda(u, v) = L_\alpha(v), \quad \forall v \in V, \quad u \in V, \tag{8}$$

donde

$$\begin{aligned} V &= H^1(\Omega); & Q &= L^2(\Gamma_2); & H &= L^2(\Omega) \\ V_0 &= \{v \in V : v|_{\Gamma_1} = 0\}; & K &= v_0 + V_0, \text{ para dado } v_0 \in V, v_0|_{\Gamma_1} = b; \\ (g, h)_H &= \int_\Omega gh \, dx; & (q, \eta)_Q &= \int_{\Gamma_2} q\eta \, d\gamma; & a(u, v) &= \int_\Omega \nabla u \nabla v \, dx; & a_\alpha(u, v) &= a(u, v) + \alpha \int_{\Gamma_1} uv \, d\gamma \\ a^\lambda(u, v) &= a(u, v) + \lambda \int_\Omega uv \, dx; & a_\alpha^\lambda(u, v) &= a(u, v) + \alpha \int_{\Gamma_1} uv \, d\gamma + \lambda \int_\Omega uv \, dx. \\ L(v) &= (g, v)_H - (q, v)_Q; & L_\alpha(v) &= L(v) + \alpha \int_{\Gamma_1} bv \, d\gamma. \end{aligned}$$

Es bien conocido, ver [2, 6], que las ecuaciones variacionales (5), (6), (7) y (8) tienen únicas soluciones. Se formulan los siguientes problemas de control óptimo C, C_α, C^λ y C_α^λ sobre g y q [1, 3, 7]:

■ **Problema de control óptimo C [1]:**

$$\text{hallar } (\bar{g}, \bar{q}) \in H \times Q \text{ tal que } J(\bar{g}, \bar{q}) = \min_{g \in H, q \in Q} J(g, q) \text{ donde} \tag{9}$$

$$J(g, q) = \frac{1}{2} \|u_{gq} - z_d\|_H^2 + \frac{M_1}{2} \|g\|_H^2 + \frac{M_2}{2} \|q\|_Q^2 \tag{10}$$

con u_{gq} la única solución de la ecuación variacional (5), para cada $g \in H$ y $q \in Q$.

■ **Problema de control óptimo C_α , para cada $\alpha > 0$, [1]:**

$$\text{hallar } (\bar{g}_\alpha, \bar{q}_\alpha) \in H \times Q \text{ tal que } J_\alpha(\bar{g}_\alpha, \bar{q}_\alpha) = \min_{g \in H, q \in Q} J_\alpha(g, q), \text{ donde} \tag{11}$$

$$J_\alpha(g, q) = \frac{1}{2} \|u_{\alpha gq} - z_d\|_H^2 + \frac{M_1}{2} \|g\|_H^2 + \frac{M_2}{2} \|q\|_Q^2, \tag{12}$$

con $u_{\alpha gq}$ la única solución de la ecuación variacional (6), para cada $g \in H$ y $q \in Q$.

■ **Problema de control óptimo C^λ , para cada $\lambda > 0$:**

$$\text{hallar } (\bar{g}^\lambda, \bar{q}^\lambda) \in H \times Q \text{ tal que } J^\lambda(\bar{g}^\lambda, \bar{q}^\lambda) = \min_{g \in H, q \in Q} J^\lambda(g, q), \text{ donde} \tag{13}$$

$$J^\lambda(g, q) = \frac{1}{2} \|u_{gq}^\lambda - z_d\|_H^2 + \frac{M_1}{2} \|g\|_H^2 + \frac{M_2}{2} \|q\|_Q^2, \tag{14}$$

con u_{gq}^λ la única solución de la ecuación variacional (7), para cada $g \in H$ y $q \in Q$.

■ **Problema de control óptimo C_α^λ , para cada $\lambda > 0$ y $\alpha > 0$:**

$$\text{hallar } (\bar{g}_\alpha^\lambda, \bar{q}_\alpha^\lambda) \in H \times Q \text{ tal que } J_\alpha^\lambda(\bar{g}_\alpha^\lambda, \bar{q}_\alpha^\lambda) = \min_{g \in H, q \in Q} J_\alpha^\lambda(g, q), \text{ donde} \tag{15}$$

$$J_\alpha^\lambda(g, q) = \frac{1}{2} \|u_{\alpha gq}^\lambda - z_d\|_H^2 + \frac{M_1}{2} \|g\|_H^2 + \frac{M_2}{2} \|q\|_Q^2, \tag{16}$$

con $u_{\alpha gq}^\lambda$ la única solución de la ecuación variacional (8), para cada $g \in H$ y $q \in Q$.

En [1], siguiendo a [3, 7], se demostró la existencia y unicidad de las soluciones de los problemas de control óptimo simultáneos C y C_α . De manera análoga se prueba la existencia y unicidad de las soluciones óptimas para los problemas C^λ y C_α^λ .

El objetivo de este trabajo es obtener el siguiente diagrama conmutativo que relaciona los problemas de control óptimo simultáneos distribuido-frontera (C_α^λ) , (C^λ) , (C_α) y (C) de la siguiente manera:

2. CONDICIONES DE OPTIMALIDAD

En esta sección, se define el estado adjunto y se dan las condiciones de optimalidad de primer orden para los problemas de control óptimo C^λ y C_α^λ . Para los problemas C y C_α , las ecuaciones adjuntas y las condiciones de optimalidad están dadas en [1].

Se define el estado adjunto p_{gq}^λ para el problema C^λ , para cada $(g, q) \in H \times Q$, como la solución de la ecuación variacional

$$a^\lambda(p, v) = (u_{gq}^\lambda - z_d, v)_H, \quad \forall v \in V_0, \quad p \in V_0 \tag{17}$$

y la condición de optimalidad está dada por

$$(p_{\bar{g}^\lambda\bar{q}^\lambda}^\lambda + M_1\bar{g}^\lambda, \eta)_H + (M_2\bar{q}^\lambda - p_{\bar{g}^\lambda\bar{q}^\lambda}^\lambda, \xi)_Q = 0, \quad \forall (\eta, \xi) \in H \times Q. \tag{18}$$

Se define el estado adjunto $p_{\alpha gq}^\lambda$ para el problema C_α^λ , para cada $(g, q) \in H \times Q$, como la solución de

$$a_\alpha^\lambda(p, v) = (u_{\alpha gq}^\lambda - z_d, v)_H, \quad \forall v \in V, \quad p \in V. \tag{19}$$

y la condición de optimalidad está dada por

$$(p_{\alpha\bar{g}_\alpha^\lambda\bar{q}_\alpha^\lambda}^\lambda + M_1\bar{g}_\alpha^\lambda, \eta)_H + (M_2\bar{q}_\alpha^\lambda - p_{\alpha\bar{g}_\alpha^\lambda\bar{q}_\alpha^\lambda}^\lambda, \xi)_Q = 0, \quad \forall (\eta, \xi) \in H \times Q. \tag{20}$$

3. COMPORTAMIENTO ASINTÓTICO DE LOS PROBLEMAS DE CONTROL ÓPTIMO

En esta sección se presenta la convergencia fuerte para los controles óptimos, los estados del sistema óptimos y los estados adjuntos óptimos de los problemas C^λ a C cuando $\lambda \rightarrow 0^+$, de los problemas C_α^λ a C_α para $\alpha > 0$ fijo, cuando $\lambda \rightarrow 0^+$, de los problemas C_α^λ a C^λ para $\lambda > 0$ fijo, cuando $\alpha \rightarrow +\infty$. La convergencia fuerte de las soluciones óptimas de C_α a C , cuando $\alpha \rightarrow +\infty$, está probada en [1].

Teorema 1 Sean $(\bar{g}^\lambda, \bar{q}^\lambda) \in H \times Q$ y $(\bar{g}, \bar{q}) \in H \times Q$ las únicas soluciones de los problemas (13) y (9) respectivamente, entonces $u_{\bar{g}^\lambda\bar{q}^\lambda}^\lambda$ es fuertemente convergente a $u_{\bar{g}\bar{q}}$ en V , $p_{\bar{g}^\lambda\bar{q}^\lambda}^\lambda$ es fuertemente convergente a $p_{\bar{g}\bar{q}}$ en V y $(\bar{g}^\lambda, \bar{q}^\lambda)$ es fuertemente convergente a $(\bar{g}, \bar{q})$ en $H \times Q$, cuando $\lambda \rightarrow 0^+$.

Teorema 2 Sean $(\bar{g}_\alpha^\lambda, \bar{q}_\alpha^\lambda) \in H \times Q$ y $(\bar{g}_\alpha, \bar{q}_\alpha) \in H \times Q$ las únicas soluciones de los problemas (15) y (11) respectivamente, para $\alpha > 0$ fijo, entonces $u_{\alpha\bar{g}_\alpha^\lambda\bar{q}_\alpha^\lambda}^\lambda$ es fuertemente convergente a $u_{\alpha\bar{g}_\alpha\bar{q}_\alpha}$ en V , $p_{\alpha\bar{g}_\alpha^\lambda\bar{q}_\alpha^\lambda}^\lambda$ es fuertemente convergente a $p_{\alpha\bar{g}_\alpha\bar{q}_\alpha}$ en V y $(\bar{g}_\alpha^\lambda, \bar{q}_\alpha^\lambda)$ es fuertemente convergente a $(\bar{g}_\alpha, \bar{q}_\alpha)$ en $H \times Q$, cuando $\lambda \rightarrow 0^+$.

Teorema 3 Sean $(\bar{g}_\alpha^\lambda, \bar{q}_\alpha^\lambda) \in H \times Q$ y $(\bar{g}^\lambda, \bar{q}^\lambda) \in H \times Q$ las únicas soluciones de los problemas (15) y (13) respectivamente, para $\lambda > 0$ fijo, entonces $u_{\alpha\bar{g}_\alpha^\lambda\bar{q}_\alpha^\lambda}^\lambda$ es fuertemente convergente a $u_{\bar{g}^\lambda\bar{q}^\lambda}$ en V , $p_{\alpha\bar{g}_\alpha^\lambda\bar{q}_\alpha^\lambda}^\lambda$ es fuertemente convergente a $p_{\bar{g}^\lambda\bar{q}^\lambda}$ en V y $(\bar{g}_\alpha^\lambda, \bar{q}_\alpha^\lambda)$ es fuertemente convergente a $(\bar{g}^\lambda, \bar{q}^\lambda)$ en $H \times Q$, cuando $\alpha \rightarrow +\infty$.

4. DOBLE CONVERGENCIA DE (C_α^λ) A (C) CUANDO $(\lambda, \alpha) \rightarrow (0^+, +\infty)$

En esta sección, se obtiene la doble convergencia de los problemas C_α^λ a C cuando $(\lambda, \alpha) \rightarrow (0^+, +\infty)$, simultáneamente.

Teorema 4 *Se tienen los siguientes límites:*

$$\lim_{(\lambda, \alpha) \rightarrow (0^+, +\infty)} \|(\bar{g}_\alpha^\lambda, \bar{q}_\alpha^\lambda) - (\bar{g}, \bar{q})\|_{H \times Q} = 0. \tag{21}$$

$$\lim_{(\lambda, \alpha) \rightarrow (0^+, +\infty)} \|u_{\alpha \bar{g}_\alpha^\lambda \bar{q}_\alpha^\lambda}^\lambda - u_{\bar{g} \bar{q}}\|_V = 0, \quad \lim_{(\lambda, \alpha) \rightarrow (0^+, +\infty)} \|p_{\alpha \bar{g}_\alpha^\lambda \bar{q}_\alpha^\lambda}^\lambda - p_{\bar{g} \bar{q}}\|_V = 0. \tag{22}$$

Prueba. Se presenta un esquema de la prueba. Se obtiene que las sucesiones $(\bar{g}_\alpha^\lambda, \bar{q}_\alpha^\lambda)$, $u_{\alpha \bar{g}_\alpha^\lambda \bar{q}_\alpha^\lambda}^\lambda$ y $p_{\alpha \bar{g}_\alpha^\lambda \bar{q}_\alpha^\lambda}^\lambda$ están acotadas independientemente de λ y α . Por lo tanto, cuando $(\lambda, \alpha) \rightarrow (0^+, +\infty)$

$$\exists f \in H : \bar{g}_\alpha^\lambda \rightharpoonup f \text{ en } H, \quad \exists \rho \in Q : \bar{q}_\alpha^\lambda \rightharpoonup \rho \text{ en } Q,$$

$$\exists \eta \in V : u_{\alpha \bar{g}_\alpha^\lambda \bar{q}_\alpha^\lambda}^\lambda \rightharpoonup \eta \text{ en } V \text{ (en } H \text{ fuerte)}, \quad \exists \xi \in V : p_{\alpha \bar{g}_\alpha^\lambda \bar{q}_\alpha^\lambda}^\lambda \rightharpoonup \xi \text{ en } V \text{ (en } H \text{ fuerte)},$$

cuando $\alpha \rightarrow +\infty$

$$\exists f^\lambda \in H : \bar{g}_\alpha^\lambda \rightharpoonup f^\lambda \text{ en } H, \quad \exists \rho^\lambda \in Q : \bar{q}_\alpha^\lambda \rightharpoonup \rho^\lambda \text{ en } Q,$$

$$\exists \eta^\lambda \in V : u_{\alpha \bar{g}_\alpha^\lambda \bar{q}_\alpha^\lambda}^\lambda \rightharpoonup \eta^\lambda \text{ en } V \text{ (en } H \text{ fuerte)}, \quad \exists \xi^\lambda \in V : p_{\alpha \bar{g}_\alpha^\lambda \bar{q}_\alpha^\lambda}^\lambda \rightharpoonup \xi^\lambda \text{ en } V \text{ (en } H \text{ fuerte)},$$

cuando $\lambda \rightarrow 0^+$

$$\exists f_\alpha \in H : \bar{g}_\alpha^\lambda \rightharpoonup f_\alpha \text{ en } H, \quad \exists \rho_\alpha \in Q : \bar{q}_\alpha^\lambda \rightharpoonup \rho_\alpha \text{ en } Q,$$

$$\exists \eta_\alpha \in V : u_{\alpha \bar{g}_\alpha^\lambda \bar{q}_\alpha^\lambda}^\lambda \rightharpoonup \eta_\alpha \text{ en } V \text{ (en } H \text{ fuerte)}, \quad \exists \xi_\alpha \in V : p_{\alpha \bar{g}_\alpha^\lambda \bar{q}_\alpha^\lambda}^\lambda \rightharpoonup \xi_\alpha \text{ en } V \text{ (en } H \text{ fuerte)}.$$

Ahora, teniendo en cuenta que $\eta = \eta^\lambda = b$ sobre Γ_1 y $\xi = \xi^\lambda = 0$ sobre Γ_1 , por la unicidad de las soluciones de los problemas (C_α^λ) , (C^λ) , (C_α) y (C) , y la unicidad de las soluciones de las ecuaciones variacionales correspondientes, se obtiene que

$$\eta^\lambda = u_{f^\lambda \rho^\lambda}^\lambda = u_{\bar{g}^\lambda \bar{q}^\lambda}^\lambda, \quad \xi^\lambda = p_{f^\lambda \rho^\lambda}^\lambda = p_{\bar{g}^\lambda \bar{q}^\lambda}^\lambda, \quad f^\lambda = \bar{g}^\lambda, \quad \rho^\lambda = \bar{q}^\lambda$$

$$\eta_\alpha = u_{f_\alpha \rho_\alpha}^\lambda = u_{\bar{g}_\alpha \bar{q}_\alpha}^\lambda, \quad \xi_\alpha = p_{f_\alpha \rho_\alpha}^\lambda = p_{\bar{g}_\alpha \bar{q}_\alpha}^\lambda, \quad f_\alpha = \bar{g}_\alpha, \quad \rho_\alpha = \bar{q}_\alpha.$$

Luego, usando [1], se tiene que

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \|f_\alpha - \bar{g}\|_H = 0, \quad \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \|\rho_\alpha - \bar{q}\|_Q = 0$$

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \|\eta_\alpha - u_{\bar{g} \bar{q}}\|_V = 0, \quad \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \|\xi_\alpha - p_{\bar{g} \bar{q}}\|_V = 0$$

y por lo tanto los límites dobles (21) y (22) se cumplen cuando $(\lambda, \alpha) \rightarrow (0^+, +\infty)$. □

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido parcialmente subsidiado por los Proyectos European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement 823731 CONMECH y PIP No. 0275 de CONICET-Universidad Austral, Rosario, Argentina para el tercer autor, y por el Proyecto PPI No. 18/C555 de SECyT-UNRC, Río Cuarto, Argentina para la primera y segunda autoras.

REFERENCIAS

[1] GARIBOLDI C. M. - TARZIA D. A., *Existence, uniqueness and convergence of simultaneous distributed-boundary optimal control problems*, Control and Cybernetics, 44, 5-17 (2015).

[2] KINDERLEHRER D. - STAMPACCHIA G., *An introduction to variational inequalities and their applications*, SIAM, Philadelphia (2000).

[3] LIONS J.L., *Contrôle optimal de systèmes gouvernés par des équations aux dérivées partielles*, Dunod, Paris (1968).

[4] TABACMAN E. D. - TARZIA D. A., *Sufficient and/ or necessary condition for the heat transfer coefficient on Γ_1 and the heat flux on Γ_2 to obtain a steady-state two-phase Stefan problem*, J. Differential Equations 77, 16–37 (1989).

[5] TARZIA D. A., *Sur le problème de Stefan à deux phases*, C. R. Acad. Sci. Paris Ser. A 288, 941–944 (1979).

[6] TARZIA D. A., *Introducción a las inecuaciones variacionales elípticas y sus aplicaciones a problemas de frontera libre*, Centro Latinoamericano de Matemática e Informática, CIAMI-CONICET, No. 5, Buenos Aires (1981).

[7] TRÖLSTZSCH F., *Optimal control of partial differential equations. Theory, methods and applications*, American Math. Soc., Providence (2010).